This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Fl
43
M88.2
S
HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

Digitized by Google

3 2044 106 329 931

Fl
43
M88.2
3

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received 28 March 1907.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Systematisches Verzeichniß

der

in der Umgegend Aachens

wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen.

Zum Gebrauch

der Schüler des Gymnasiums und anderer Schulen

zusammengestellt

von

Joseph Müller, Gymnasial-Lehrer.

Aachen 1832.

Commission und Druck der Schulbuchhandlung,

Jakobstraße, Num. 936.

Digitized by Google

Gray Herbarium.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Tafel der Klassen.

Klasse.	Bestimmung der Klasse.	Beispiele.
1. Monandria . . .	1 Staubgefäß	Wasserstern.
2. Diandria	2 Staubgefäße	Ehrenpreis.
3. Triandria	3 Staubgefäße	Schwertlilie.
4. Tetrandria . . .	4 Staubgefäße	Wegerich.
5. Pentandria . . .	5 Staubgefäße	Schlüsselblume.
6. Hexandria	6 Staubgefäße	Schneeglöckchen.
7. Heptandria . . .	7 Staubgefäße	Roßkastanie.
8. Octandria	8 Staubgefäße	Heide.
9. Enneandria . . .	9 Staubgefäße	Wasserviole.
10. Decandria	10 Staubgefäße	Sauerklee.
11. Dodecandria . . .	12 bis 19 Staubgefäße	Wolfsmilch.
12. Icosandria	mehr als 20 Staubgefäße auf dem Kelche	Rose.
13. Polyandria . . .	mehr als 20 Staubgefäße auf dem Fruchtboden . .	Ritterſporn.
14. Didynamia . . .	4 Staubgefäße, von welchen 2 länger	Fingerhut.
15. Tetradynamia . .	6 Staubgefäße, von welchen 4 länger	Täſchelkraut.
16. Monadelphia . . .	die Staubfäden in Einen Körper verwachſen . . .	Malve.
17. Diadelphia . . .	die Staubfäden in 2 Körper verwachſen	Ginſter.
18. Polyadelphia . . .	die Staubfäden in 3 oder mehre Körper verwachſen	Johanniskraut.
19. Syngenesia . . .	die Staubkolben in eine Röhre verwachſen	Kreuzkraut.
20. Gynandria	die Staubfäden mit dem Piſtill verwachſen	Orchis.
21. Monœcia	männliche und weibliche Blüthen auf Einem Stamm .	Zaunrübe.
22. Diœcia	männliche und weibliche Blüthen auf 2 Stämmen .	Hopfen.

Digitized by Google

Classis I.

Monandria, stamen unicum.

Ordo II. Dyginia, stili 2.

Callitriche, verna
— minima.

Klasse I.

Einmännige, ein Staubgefäß.

Ordnung II. Zweiweibige, 2 Pistille.

Wasserstern, Frühlings-W.
— kleinster W.

Classis II.

Diandria, stamina 2.

Ordo I. Monogynia, stilus unicus.

Ligustrum, vulgare.
Veronica, serpyllifolia.
— scutellata.
— anagallis.
— beccabunga.
— officinalis.
— montana.
— chamædrys.
— arvensis.
— agrestis.
— hederæfolia.
— triphyllos.
Utricularia, vulgaris.
Lycopus, europæus.
Salvia, pratensis.
Circæa, lutetiana.
Fraxinus, excelsior.
Lemna, minor.
— gibba.
— polyrrhiza.

Klasse II.

Zweimännige, 2 Staubgefäße.

Ordnung I. Einweibige, ein Pistill.

Hartriegel, gemeiner.
Ehrenpreis, quendelblätteriger.
— schildsamiger.
— Wasser-Ehrenpreis.
— Bachbunceu.
— echter.
— Berg-Ehrenpreis.
— Gamander-Ehrenpr.
— Feld-Ehrenpr.
— Acker-Ehrenpr.
— epheublätteriger.
— dreiblätteriger.
Wasserschlauch, gemeiner.
Wolfsfuß, gemeiner.
Salbei, Wiesen-S.
Hexenkraut, gemeines.
Esche, gemeine.
Wasserlinse, kleine.
— höckerige.
— vielwurzelige.

Digitized by Google

Monandria. 2. Spec.

Veronica scutellata L. Se trouve dans les marais des environs de Malmedy. Lej.

V. spadana Lej. var de V. officinalis L.? Se trouve dans les montagnes près de Malmedy. Mad: Libert. Lej. Fl. de Spa.

Circaea intermedia Hoffm. Se trouve dans les bois montueux, près de Malmedy. Lej. Fl. de Spa.

Circaea alpina L. Se trouve dans les bois, près de Sourbrouck. Lej. Fl.
Burtscheid & Stadtwald (Meigen)

Digitized by Google

Diandria. 20. Spec.

Valeriana dioica L. Malmedy. Lej. Fl. de Spa.

Gis sibirica L. Gispa (M. & Wal)

Schoenus compressus L. Malmedy. Lej. Suppl.

Der wirkliche Cyperus rhenanus existirt zu Bonn obsgleich bei Bonn in Gesellschaft mit Cyperus longus L. Spalb mit C. badius Desf. monoschell. L. Fauv. Byander, dessen ich deutsche Exemplare mittheilte, verbunden sind die Exemplare für eine neue Art zu C. virens Vahl. rhenanus.

Weihe in der Flora 1828.

Eriophorum vaginatum L. Malmedy. Lej. Fl. de Sp.

Carex stricta L. Malmedy. Lej. Fl. Spa. Helberg. M. & Wau

Leersia oryzoides Schr. Helberg (M. & Wau.)

Agrostis sylvatica L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Agrostis alpina L. Malmedy. Lej. Suppl.

Bromus sylvaticus Schr. Helberg. Cornelimünster (M. & Wau.)

Digitized by Google

Ordo II. Digynia, stili 2.

Anthoxanthum odoratum.

Ordnung II. Zweiweibige, 2 Piſtille.

Ruchgras, gelbes.

Classis III.

Triandria, stamina 3.

Ordo I. Monogynia, stilus unicus.

Valeriana, dioica.

— officinalis.

Fedia, olitoria.

— carinata.

Iris pseudacorus.

Polycnemum arvense.

Schœnus albus.

Cyperus longus.

Scirpus, cespitosus.

— bœothryon.

— palustris.

— acicularis.

— lacustris.

Eriophorum, cespitosum.

— angustifolium.

— latifolium.

Ordo II. Digynia, stili 2.

Alopecurus, pratensis.

— agrestis.

Phleum, pratense.

Milium, effusum.

Agrostis, spica venti.

Arundo, phragmites.

Klaſſe III.

Dreimännige, 3 Staubgefäße.

Ordnung I. Einweibige, ein Piſtill.

Baldrian, kleiner.

— echter.

Limmerſalat, gewöhnlicher.

— gekielter.

Schwertlilie, Waſſer-Sch.

Knorpelkraut, Acker-K.

Knopfgras, weißes.

Cypergras, langes.

Binſe, Moor-B.

— Torf-B.

— Sumpf-B.

— nadelförmige.

— See-B.

Wollgras, Raſen-W.

— ſchmalblätteriges.

— breitblätteriges.

Ordnung II. Zweiweibige, 2 Piſtille.

Fuchsſchwanz, Wieſen-F.

— Acker-F.

Lieſchgras, Wieſen-L.

Hirſegras, ausgebreitetes.

Windhalm, echter.

Rohr, gemeines.

Digitized by Google

Aira, cristata.
— caryophyllea.
— præcox
Holcus, lanatus.
Panicum, glaucum.
— crus galli.
Lolium, temulentum *
— perenne.
— arvense.
Poa, aquatica.
— annua.
Cynosurus, cristatus.
Festuca, ovina.
— glauca.
— rubra.
Bromus, arvensis.
— inermis.
— tectorum.
— sterilis.
Triticum, repens.
Briza, media.

Schmiele, kammartige.
— silberglänzende.
— frühzeitige.
Honiggras, wollichtes.
Fennich, gelbhaariger.
— Hahnsporn-F.
Lolch, betäubender.
— ausdauernder.
Acker-L.
Rispengras, Wasser-R.
— jähriges.
Kammgras, gemeines.
Schwingel, Schaf-Sch.
— graugrüner.
— rother.
Trespe, Acker-T.
— grannenlose.
— Dach-T.
Trespe, unfruchtbare.
Weizen, gemeine Quecke.
Zittergras, gemeines.

Ord. III. Trigynia, stili 3.

Montia, fontana major.
Holosteum, umbellatum.

Ord. III. Dreiweibige, 3 Pistille.

Montie, große Quell-M.
Nelkengras, schirmförmiges.

Classis IV,

Tetrandria, stamina 4.

Ord. I. Monogynia, stilus unicus.

Dipsacus, silvestris.

Klasse IV.

Viermännige, 4 Staubgefäße.

Ord. I. Einweibige, ein Pistill.

Kardendistel, wilde.

*) Die mit * bezeichneten Pflanzen sind giftig.

Digitized by Google

Aira montana L. Malmedy. Lej. Sp.
Melica nutans L. Malmedy. Lej. Sp.
Elymus europaeus L. Malmedy. Lej.
Festuca bromoides L. Mayen (M. & Mos.)
F. rimosa L. Stolberg (M. & Wes.)
F. sylvatica L. Malmedy (M. & Wes.)
F. gracilis L. Stolberg (M. & Wes.)
Avena strigosa L. Malmedy. Lej. suppl. Stolberg. (M. & W.)
Avena pratensis L. Düren (M. & W.)

Poa trinervata Willd. Se trouve dans les bois de Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Poa sudetica Hoffm. Se trouve dans tous les bois montueux de l'arr
dissement de Malmedy. Lej. Fl. d. Sp.
Poa palustris Lej. Se trouve dans les bois ombragés, aux env
rons de Malmedy. Lej. Fl. de Sp.

Poa rubens Willd. Malmedy. Lej. Fl. de Sp.

Poa rhenana DC. Ou varietas poae bulbosae L. Malmedy. Lej. Fl. d. Sp.
Poa laxa Sert. Malmedy. Lej. Fl. de Sp. Stolberg (M. & Wes.)
Juncus tenuis L. Se trouve aux environs de Malmedy. Lej. Fl. d. Sp.
Stolberg. M. & W.
Bromus mollis Willd. Malmedy. Lej. Fl. d. Sp.
Bromus racemosus L. var. B. à feuilles velues. Malmedy. Lej.
Bromus pratensis DC. Malmedy. Lej. — Bromus asper L. Stolberg. M. & W.
Arundo Pseudo-Phragmites Host. Malmedy. Lej.
Arundo Epigejos L. Malmedy. Lej.
Triandria. 45 Spec. Arundo Calamagrostis L. Malmedy. Lej.
Montia fontana L. Malmedy. Rhenanicum. Lej. Fl. esp.

Lysimachia nemorum L. Malmedy. Lej. Haverbroich. (Meis.)

Digitized by Google

Globularia vulgaris L. fes. Manson L. Malberg aux Pinacordier.

Scabiosa sylvatica L. se trouve dans les bois ombragés, aux environs de Malmedy, surtout à Rhenastein. Lej. Fl. de Sp.

Sanguisorba officinalis L. var. à Liège Commentaire inferieurement. Malmedy. Lej. Spec.
Ormes montana L. Commentaire aux Rochers sous Sart Liège. Meigen.

Galium saxatile Weig. Malmedy. Lej.
Galium erectum Hoffm. Se trouve dans les prairies, fonds d'Eupen. Lej. Fl. Sp.

Centunculus minimus L. Aachen (Weig.)

Tetrandria. 26 Spec.

Digitized by Google

Dipsacus, pilosus.	Kardendiſtel, haarige.
Scabiosa, succisa.	Skabioſe, Sumpf-Sk.
— arvensis.	— Acker-Sk.
— columbaria.	— Tauben-Sk.
Sanguisorba, officinalis.	Wieſenkopf, gemeiner.
Plantago, major.	Wegerich, großer.
— media.	— mittler,
— lanceolata.	— lanzetblätteriger.
Galium, uliginosum.	Labkraut, Moraſt-L.
— verum.	— echtes.
— aparine.	— klebendes.
— mollugo.	— weißes.
— silvaticum.	— Wald-L.
— palustre.	— Sumpf-L.
Asperula, odorata.	Waldmeiſter, wohlriechender.
Sherardia, arvensis.	Sherardie, Acker-Sh.
Vaillantia, cruciata.	Vaillantie, gemeine.
Alchemilla, vulgaris.	Löwenfuß, gemeiner.

Ord. IV. Tetragynia, stili 4.	Ord. IV. Vierweibige, 4 Piſtille.
Ilex, aquifolium.	Hülſen, gemeine.
Potamogeton, natans.	Saamkraut, ſchwimmendes.
— pusillus.	— kleines.
— compressus.	— flachſtengliches.
— lucens.	— durchſcheinendes.
Sagina, procumbens.	Maſtkraut, liegendes.
Radiola, linoides.	Strahlkraut, leinartiges.

Digitized by Google

Classis V.

Pentandria, stamina 5.

Ord. 1. Monogynia, stilus unicus.

Echium, vulgare.
Myosotis, palustris.
— intermedia.
— arvensis.
— versicolor.
Primula, vulgaris.
— elatior.
Lithospermum, arvense.
Anchusa, officinalis.
Cynoglossum, officinale.
Pulmonaria, officinalis.
Symphytum, officinale.
Lycopsis, pulla.
Menyanthes, trifoliata.
Hottonia palustris.
Lysimachia, vulgaris.
— nemorum.
— numularia.
Anagallis, arvensis.
Convolvulus, arvensis.
— sepium. *
Hyoscyamus, niger. *
Verbascum, thapsus.
— nigrum.
Solanum, dulcamare. *
— nigrum. *
Chironia, centaurium.

Klasse V.

Fünfmännige, 5 Staubgefäße.

Ord. 1. Einweibige, ein Pistill.

Natterkopf, gemeiner.
Mausohr, Sumpf-M. (Vergißmeinnicht.)
— mittleres.
— Acker-M.
— buntes.
Schlüsselblume, gemeine.
— große.
Steinsame, Acker-St.
Ochsenzunge, gemeine.
Hundszunge, gemeine.
Lungenkraut, gemeines.
Wallwurz, gemeine.
Krummhals, schwarzbrauner.
Fieberklee, dreiblätteriger.
Wasserfeder, Sumpf-W.
Lysimachie, gemeine.
— Wald-L.
— rundblätterige.
Gauchheil, Acker-G.
Winde, Acker-W.
— Zaun-W.
Bilsenkraut, schwarzes.
Wollkraut, Königskerze.
— schwarzes.
Nachtschatten, Bittersüß.
— schwarzer.
Chironie, Tausendgüldenkraut.

Digitized by Google

Lithospermum officinale L. Linn. M. & Wett.
Pulmonaria montana Lej. Malmedy. Lej. Cl. de Spa.

Gnidbarg. Direct. M. & Wett.
Anagallis carnea Lej. Stolberg. Meig.

Herbarium Cynanchi L. Aachen. M. & Wett. direct.
Herbarium hybridum Lej. V. vinceto-Cynanchi. Malmedy. Lej. rappel.
V. nigrum 4. var. à flagro blanches. Malmedy. Lej. rappel.
V. Alop. coeruleo-P. Cornu Cimmerien M. & Wett.
Herbarium Blattaria L. Malmedy Lej.
Atropa Belladonna L. Malmedy. Lej.
Convolvulus arvensis β. villosus Lej. Rec. Malmedi.

Digitized by Google

Polemonium coeruleum L. Aachen. Meig

C. glomerata L. Stolberg. Meigen.
Campanula hederacea L. Elle croît aussi en abondance dans les environs de Malmedy. Lej. Fl. d. Sp.
Campanula persicifolia L. β, var. albiflora. Stolberg. Meigen
Campanula hirsuta Lej. Malmedy. Lej. rappel.
Circaea alpina x lutetiana Fischer. Aachen ang. dans Gelgenberg. Ms. d. Wm.

Lonicera etrusca Santi. Malmedy. Lej. rappel.
Lonicera quercifolia Clusius b. Stolberg. M.
L. Xylosteum L. Cornelimünster. M. d. Wm.

Viola lutea Smith. Fl. Brit. Se trouve dans les pâturages secs et les terrains calaminaires, près de Theux, Malmedy, Aix-la-Chapelle, Münsterbusch & Stolberg. Lej. Fl. de Sp.
Thesium linophyllum L. entre Malmedy et Rhenardein. Lej. Fl. de Spa.

Ribes nigrum L. Stolberg M. d. Wm.

Hieracium verbascifolium L. Malmedy. Lej. rappel. Sibth rep.

Gentiana cruciata L. entre Goër & Supen. Lej. Fl. Sp.
Gentiana lutea L. L'auteur Lucas, dans son ouvrage sur les eaux de Borcette et d'Aix-la-Chapelle, assure avoir observé cette plante dans les pâturages ouverts du Limbourg. Lej. Limburg
Swertia perennis L. Se trouve dans les marais de l'Eiffel. Lej. Fl. Sp.

Digitized by Google

Vinca, minor. Hochrig.
Phyteuma, pauciflorum.
— spicatum.
Campanula, trachelium.
— rapunculus.
— rotundifolia.
— speculum.
Lonicera, caprifolium.
Rhamnus, catharticus.
— frangula.
Evonymus, europæus *
Impatiens, nolitangere. Mokrady. Kj.
Viola, palustris. Mokrady. Kj.
— odorata.
— canina.
— tricolor. Divci. — Mokrjoc v.
— arvensis.
Ribes, rubrum.
— grossularia.
— uva crispa.
Hedera, helix.
Iasione, montana. Kirch

Ordo II. Digynia, stili 2.

Gentiana, lutea.
— amarella.
— pneumonanthe. Mokrady. Kj.
— filiformis. vrchnjoi. Mokrady Strmolin
Cuscuta, europæa.
— epithymum.
Atriplex, hastata.

Sinngrün, kleines.
Rapunzel, wenigblüthiger.
— ährenblüthiger.
Glockenblume, gemeine.
— Rapunzel-G.
— rundblätterige.
— Venusspiegel.
Specklilie, Geisblatt.
Kreuzdorn, gemeiner.
— Faulbaum.
Spillbaum, gemeiner.
Balsamine, wilde.
Veilchen, Sumpf-V.
— wohlriechendes.
— Hunde-V.
— dreifarbiges.
— Acker-V.
Johannisbeere, gemeine.
Stachelbeere, gemeine.
— wilde.
Epheu, gemeiner.
Jasione, Berg-J.

Ordnung II. Zweiweibige, 2 Pistille.

Enzian, gelber.
— kleiner.
— gemeiner.
— fadenförmiger.
Flachsseide, europäische.
— Thymian-F.
Melde, spontonförmige.

Digitized by Google

Polemonium coeruleum L. Aachen. Meigen

C. glomerata L. Stolberg. Meigen.
Campanula hederacea L. Elle croît aussi en abondance dans les environs de Malmedy. Lej. R. de Sp.
Campanula persicifolia L. β, var. albiflora. Stolberg. Meigen.
Campanula hirsuta Lej. Malmedy. Lej. Nyman.
Phyteuma spicatum hybridum L. Aachen aux bois de Gulpenberg. M. & Web.

Lonicera alpigena Jacq. Malmedy. Lej. Nyman.
Lonicera quercifolia Chamaed. b. Stolberg. M.
L. Xylosteum L. Cornelimünster. M. & Web.

Viola lutea Smith. R. Brit. Se trouve dans les pâturages secs et les terrains calaminaires, près de Theux, Malmedy, Aix-la-Chapelle, Montjoie & Stolberg. Lej. Fl. de Sp.
Thesium linophyllum L. entre Malmedy et Rhenardein. Lej. Fl. de Spa.

Ribes nigrum L. Stolberg M. & Web.

Hieracium verbascifolium L. Malmedy. Lej. Nyman. Schleich exp.

Gentiana cruciata L. entre Goër & Eupen. Lej. Fl. Sp.
Jasione montana L. Le docteur Lucas, dans son ouvrage sur les eaux de Borcette et d'Aix-la-Chapelle, assure avoir observé cette plante dans les pâturages ouverts du Limbourg. Lej. Limburg
Swertia perennis L. Se trouve dans les marais de l'Eiffel. Lej. Fl. Sp.

Digitized by Google

Vinca, minor.
Phyteuma, pauciflorum.
— spicatum.
Campanula, trachelium.
— rapunculus.
— rotundifolia.
— speculum.
Lonicera, caprifolium.
Rhamnus, catharticus.
— frangula.
Evonymus, europæus *
Impatiens, nolitangere.
Viola, palustris.
— odorata.
— canina.
— tricolor.
— arvensis.
Ribes, rubrum.
— grossularia.
— uva crispa.
Hedera, helix.
Iasione, montana.

Sinngrün, kleines.
Rapunzel, wenigblüthiger.
— ährenblüthiger.
Glockenblume, gemeine.
— Rapunzel-G.
— rundblätterige.
— Venusspiegel.
Specklilie, Geisblatt.
Kreuzdorn, gemeiner.
— Faulbaum.
Spillbaum, gemeiner.
Balsamine, wilde.
Veilchen, Sumpf-V.
— wohlriechendes.
— Hunde-V.
— dreifarbiges.
— Acker-V.
Johannisbeere, gemeine.
Stachelbeere, gemeine.
— wilde.
Epheu, gemeiner.
Jasione, Berg-J.

Ordo II. Digynia, stili 2.

Gentiana, lutea.
— amarella.
— pneumonanthe.
— filiformis.
Cuscuta, europæa.
— epithymum.
Atriplex, hastata.

Ordnung II. Zweiweibige, 2 Pistille.

Enzian, gelber.
— kleiner.
— gemeiner.
— fadenförmiger.
Flachsseide, europäische.
— Thymian-F.
Melde, spontonförmige.

Digitized by Google

Ulmus, campestris.	Ulme, gemeine.
— effusa.	— langstielige.
Eryngium, campestre.	Mannstreu, Feld-M.
Hydrocotyle, vulgaris.	Wassernabel, gemeiner.
Sanicula, europæa.	Sanickel, gemeiner.
Oenanthe, fistulosa.	Rebendolde, röhrige.
Conium, maculatum *	Schierling, gefleckter.
Selinum, palustre.	Silge, Sumpf-S.
Daucus, carota.	Mohrrübe, wilde.
Angelica, sylvestris.	Angelika, gemeine.
Sium, latifolium.	Merk, breitblätteriger.
Heracleum, sphondylium.	Bärenklau, gemeiner.
Phellandrium, aquaticum.	Wasserfenchel, gemeiner.
Cicuta, virosa *	Wasserschierling, giftiger.
Aethusa, cynapium *	Gleise, Garten-G.
Chærophyllum, silvestre.	Kälberkropf, gemeiner.
— bulbosum.	— knolliger.
— temulum.	— berauschender.
— sativum.	gemeiner Kerbel.
Pastinaca, sativa.	Pastinak, wilder.
Scandix, pecten.	Kerbel, langsamiger.
Pimpinella, saxifraga.	Bibernell, gemeine.
— dissecta.	— spitzblätterige.
— magna.	— große.
Aegopodium, podagraria.	Geißfuß, gemeiner.
Chenopodium, bonus Henricus.	Gänsefuß, Dorf-G.
— hybridum.	— Bastard-G.
— vulvaria.	— stinkender.
— album.	— weißer.
— polyspermum.	— vielsamiger.

Digitized by Google

Hydrocotyle vulgaris L. Malmedy. Fej.

Bupleurum falcatum L. entre Mont-Rigaille & Mont-la-Chapelle Fej

Selinum carvifolia L. Malmedy. Fej. Fl. de Spa.

Athamanta meum L. Malmedy. Fej. Spa.

Scandix odorata L. Malmedy. Fej. Fl. de Spa.

Imperatoria Ostruthium L. Malmedy. Fej. Fl. de Spa.

Carum Carvi L. entre Marchet & Malmedy. Fej. Fl. de Spa.

Pimpinella dissecta Will. Se trouve dans les bois, près de Malmedy, surtout à Rhenâtelin. Fej. Fl. Spa.

Pimpinella peregrina L. Malmedy, sur les rochers. Fej. Spa.

Daucalis latifolia L. Malmedy. Fej. Suppl.

Digitized by Google

Saxifraga racemosa L. Malmedy Zej. Fl. Sp.

Parnassia palustris L. Malmedy. Zej. Fl. Sp.
Statice Pseud-Armeria. Auf dem Steinberge b. Burgsandorf. (O. Stanis Dr.)

Drosera longifolia L. Zi. Eyfen. Gainsberg. Malmedy.
Pentandria. gyn. Spec

nitrogalum luteum L. (O. Ornithogalum Fr.?) Malmedy. Zej. Sp.
Anthericum verticillata L. Malmedy. Zej. Fl. & Sp. Gainsberg

Narthecium ossifragum. Gainsberg. Malmedy. Zej. Fl. d. Sp.

Juncus filiformis L. Malmedy. Zej. Fl. Sp.
Juncus fluitans Lam. Malmedy. Zej. Fl. Sp.

Digitized by Google

Ord. III. Trigynia, stili 3.

Viburnum, opulus.
Sambucus, nigra.
— ebulus.
Alsine, media.

Ordo V. Pentagynia, stili 5.

Statice, armeria.
Linum, tenuifolium.
Drosera, rotundifolia.
Myosurus, minimus.

Ord. III. Dreiweibige, 3 Pistille.

Schneeball, gemeiner.
Hollunder, gemeiner.
— Zwerg-H.
Miere, gemeine.

Ordnung V. Fünfweibige, 5 Pistille.

Grasnelke, gemeine.
Flachs, feinblätteriger.
Sonnenthau, rundblätteriger.
Mäuseschwanz, kleinster

Classis VI.

Hexandria, stamina 6.

Ord. I. Monogynia, stilus unicus.

Galanthus, nivalis.
Narcissus, pseudo-narc.
Allium, ursinum.
Convalaria, majalis.
— multiflora.
— bifolia.
— polygonatum.
Acorus, calamus.
Juncus, bufonius.
— squarrosus.
— capitatus.
— subverticillatus.
— tenageia.

Klasse VI.

Sechsmännige, 6 Staubgefäße.

Ordnung I. Einweibige, ein Pistill.

Schneeglöckchen, gemeines.
Narcisse, gemeine.
Lauch, Bären-L.
Maiblume, gemeine.
— vielblüthige.
— zweiblätterige.
— Weißwurz-M.
Kalmus, gemeiner.
Simse, Kröten-S.
— sparrige.
— köpfige.
— quirlblätterige.
— Schlamm-S.

Digitized by Google

Ord. III. Triginia, stili 3.

Rumex, patientia.
— sanguineus.
— acetosa.
— acetosella.
Colchicum, autumnale *

Ord. III. Dreiweibige, 3 Pistille.

Ampfer, Garten-A.
— blutrother.
— Sauerampfer.
— kleiner.
Zeitlose, Herbst-Z.

Classis VII.

Hèptandria, stamina 7.

Ordo I. Monogynia, stilus unicus.

Aesculus, hyppocastanum.

Klasse VII.

Siebenmännige, 7 Staubgefäße.

Ord. 1. Einweibige, ein Pistill.

Roßkastanie, gemeine.

Classis VIII.

Octandria, stamina 8.

Ordo I. Monogynia, stilus unicus.

Epilobium, angustifolium.
— hirsutum.
— pubescens.
— palustre.
Oenothera, biennis.
Acer, campestre.
Erica, tetralix.
— vulgaris.
Daphne, mezereum *

Ord. III. Trigynia, stili 3.

Polygonum, bistorta.
— viviparum.
— amphibium.

Klasse VIII.

Achtmännige, 8 Staubgefäße.

Ordnung 1. Einweibige, ein Pistill.

Weiderich, schmalblätteriger.
— großblüthiger.
— kleinblüthiger.
— Sumpfweiderich.
Nachtkerze, zweijährige.
Ahorn, Feldahorn.
Heide, Sumpf-H.
— gemeine.
Seidelbast, gemeiner.

Ord. III. Dreiweibige, 3 Pistille.

Knöterig, Wiesen-K., Natterwurz.
— zwiebeltragender.
— Wasser-K.

Digitized by Google

Juncus acutus L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Juncus squarrosus L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Triglochin palustre L. Malmedy. Lej.
Colchicum vernum Rot. Malmedy. Lej. suppl.
Colchicum montanum L. Malmedy. Lej. suppl.
Hexandria 18 Spec.

Fritillaria imperialis L. Malmedy. Lej.
Hexandria 1 Sp.

Epilobium palustre L. dans les marais des environs de Malmedy Lej. Fl. Sp.

Acer platanoides L. Malmedy. Lej. Fl.

Digitized by Google

Polygonum Lapathifolium L. Malmedy Lej. Fl. de Sp.
P. Hydropiperoides Lej. P. minus Willd. Malmedy. Lej. Fl. d. Sp.
Polygonum Bellardi All. Malmedy. Lej. rappel.

Octandria. 20. Spec.

Enneandria 1 Spec.

Rumex Hydrolapathum L. Malmedy. Lej. rappel.
Rumex palustris L. dans les marais de l'Eiffel. Lej. Fl. Sp.
Andromeda polyfolia L. Entre Malmedy et le Sart.
Vaccinium uliginosum L. dans les marais tourbeux près de Malmedy. Lej.
Vaccinium vitis idaea L. Malmedy. Lej. Fl. de Sp.
Pyrola rotundifolia L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Pyrola minor L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Saxifraga palmata Hoffm. Fl. Germ. Se trouve sur les rochers ombragés, près de Malmedy, à Rhénardein. Lej. Fl. de Sp.

Digitized by Google

Polygonum, hydropiper.
— aviculare.
— fagopyrum.
— convolvulus.

Knöterig, Wasserpfeffer.
— Vogel-K. oder Wegetritt.
— Buchweizen oder Heidekorn.
— Winde-K.

Ord. IV. Tetragynia, stili 4.

Ord. IV. Vierweibige, 4 Pistille.

Paris, quadrifolia *
Adoxa, moschatellina.
Myriophyllum, spicatum.
— verticillatum.

Einbeere, vierblätterige.
Bisamkraut, echtes.
Tausendblatt, ährenblüthiges.
— quirlblüthiges.

Classis IX.

Enneandria, stamina 9.

Ord. VI. Hexagynia, stili 6.

Butomus, umbellatus.

Klasse IX.

Neunmännige, 9 Staubgefäße.

Ord. VI. Sechsweibige, 6 Pistille.

Wasserviole, schirmblüthige.

Classis X.

Decandria, stamina 10.

Ord. I. Monogynia, stilus unicus.

Ledum, palustre.
Pyrola, rotundifolia.
Vaccinium, myrtillus.
— vitis Idœa.

Klasse X.

Zehnmännige, 10 Staubgefäße.

Ord. I. Einweibige, ein Pistill.

Porst, Sumpf-P.
Wintergrün, rundblätteriges.
Heidelbeere, gemeine.
Preußelbeere.

Ordo II. Digynia, stili 2.

Ordnung II. Zweiweibige, 2 Pistille.

Saxifraga, granulata.
— tridactylites.
Chrysosplenium, alternifolium.
— oppositifolium,

Steinbrech, körniger.
— dreitheiliger.
Goldmilz, wechselblätterige.
— entgegengesetzblätterige.

Digitized by Google

Scleranthus, annuus.
— perennis.
Gypsophila, muralis.
Saponaria, officinalis.
Dianthus, armeria.
— prolifer.

Ord. III. Trigynia, stili 3.

Silene, nutans.
— behen.
Stellaria, holostea.
— graminea.
— alsine.
— palustris.
Arenaria, serpyllifolia.
— trinervia.
— rubra.
— verna.
— tenuifolia.

Ord. IV. Pentandria, stili 5.

Sedum, telephium.
— rupestre.
— saxatile.
— album.
— acre.
Oxalis, acetosella.
Agrostemma, Githago.
Lychnis, flos cuculi.
Cerastium, vulgatum.
— viscosum.

Knauel, jähriger.
— ausdauernder.
Gypskraut, Mauer-G.
Seifenkraut, gemeines.
Nelke, Büschelnelke.
— sprossende.

Ord. III. Dreiweibige, 3 Pistille.

Silene, überhängende.
— gemeine.
Sternkraut, großblüthiges.
— grasartiges.
— mierenartiges.
— Sumpf-St.
Sandkraut, quendelblätteriges.
— dreinerviges.
— rothblüthiges.
— Frühlings-S.
— dünnblätteriges.

Ord. IV. Fünfweibige, 5 Pistille.

Sedum, knolliges oder fette Henne.
— Felsen-S.
— Stein-S.
— weißes.
— scharfes.
Sauerklee, gemeiner.
Rade, gemeine.
Lychnis, Kuckucks-L.
Hornkraut, gemeines.
— schmieriges.

Digitized by Google

Sagenaria Vaccaria L. Malmedy. Exj. Fl. Sp.

Millaria nemorum L. Malmedy. Exj. Fl. Sp.
Cucubalus marilimus Lam. Malmedy. Exj. suppl.

Arenaria serpilifolia Willd. près d'Aix-la-Chapelle. Exj. Fl. Sp.

Stellaria Holostea L. var. à fleurs pourpurines. Malmedy. Exj. suppl.
Stellaria graminea Exj. Malmedy. Exj. suppl.

Cerastium brachypetalum. Aragon!

Digitized by Google

Decandria . Hexa

Dodecandria Hexa

Digitized by Google

Cerastium, semidecandrum.
— arvense.
— aquaticum.
Spergula, arvensis.
— pentandra.
— nodosa.

Hornkraut, kleines.
— Acker-H.
— Wasser-H.
Spark, Acker-S.
— fünfmänniger.
— knotiger.

Classis XI.

Dodecandria, stamina 12 — 19.

Ord. 1. Monogynia, stilus unicus.

Lythrum, salicaria.

Ordo II. Digynia, stili 2.

Agrimonia, eupatoria.

Ord. III. Tryginia, stili 3.

Reseda, luteola.
— lutea.
Euphorbia, peplus.
— lathyris. *
— segetalis.
— helioscopia.
— esula.
— cyparisias *

Ord. IV. Dodecagynia, stili 12.

Sempervivum, tectorum.

Klasse XI.

Zwölfmännige, 12—19 Staubgefäße.

Ord. I. Einweibige, ein Pistill.

Blutkraut, gemeines.

Ordnung II. Zweiweibige, 2 Pistille.

Odermennig, gemeiner.

Ord. III. Dreiweibige, 3 Pistille.

Resede, gelbliche.
— gelbe.
Wolfsmilch, Garten-W.
— kreuzblätterige.
— Acker-W.
— Sonnen-W.
— gemeine.
— Cypressen-W.

Ord. IV. Zwölfweibige, 12 Pistille.

Hauswurz, gemeine.

Digitized by Google

Classis XII.

Icosandria, stamina plura calici inserta.

Ord. I. Monogynia, stilus unicus.

Prunus, padus. *
— cerasus.
— avium.
— spinosa.
— domestica.

Ord. II. Digynia, stili 2.

Cratægus, oxyacantha.
— monogyna.

Ord. III. Trigynia, stili 3.

Sorbus, aucuparia.

Ord. IV. Pentagynia, stili 5.

Mespilus, germanica.
Pyrus, communis,
— malus.
Spiræa, ulmaria.

Ord. V. Polygynia, stili plures.

Rosa, agrestis.
— cannina.
Rubus, Idæus.
Fragaria, vesca,
Potentilla, anserina.
— recta.

Klasse XII.

Zwanzigmännige, mehr als 20 Staubgefäße auf dem Kelche.

Ord. I. Einweibige, ein Pistill.

Pflaumenbaum, Vogel-Pf.
Sauerkirschbaum.
Vogelkirschbaum.
Schlehen oder Schwarzdorn.
Gemeiner Zwetschenbaum.

Ord. II. Zweiweibige, 2 Pistille.

Weißdorn, gemeiner.
— spitzblätteriger.

Ord. III. Dreiweibige, 3 Pistille.

Ebereſche, gemeine.

Ord. IV. Fünfweibige, 5 Pistille.

Mispelbaum, gemeiner.
Birnbaum, gemeiner.
Gemeiner Apfelbaum.
Spierſtaude, Sumpf-S.

Ord. V. Vielweibige, mehr als 5 Pistille.

Roſe, weiße Feldroſe.
— Hunds-R.
Himbeere, gemeine.
Erdbeere, wilde.
Fingerkraut, Gänſerich.
— aufrechtes.

Digitized by Google

Rosa glaucantha L.
var. 1. à calyces velues. Malmedy. Lej. rupyl.

Rosa nitens Desv. Se trouve dans les bois Lej. rupyl.
Rosa Eglanteria Lois. Malmedy. Lej. rupyl.
Rosa arvensis ovata Desv. R. ovata Lej. Malmedy. Lej. rupyl.
Rosa umbellata Tibert. Jacq. Malmedy. Lej. rupyl.
Rosa collina DC.? Rosa canina collina Desv. Malmedy. Lej. rupyl.
Rosa pulverulenta Bill. Malmedy. Lej. rupyl.
Rosa mollis Sm. Tibert. Malmedy. Lej. rupyl.
Rosa stylosa Desv. Malmedy. Lej. rupyl.
Rosa villosa L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Rosa Pseudo-rubiginosa Lej. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Rosa rubiginosa L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Rosa tomentosa Sm. Malmedy. Lej. Fl. d Sp.
Rosa dumetorum Thuill. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Rosa malmundariensis Lej. Se trouve dans les bois, près de Malmedy.
Serait-ce une simple variété du Rosier des chiens ? Lej. Fl. Sp.
Rosa repens Lois. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Digitized by Google

Tormentilla reptans L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Geum intermedium Hoffm. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Geum rivale L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Comarum palustre L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Rubus tomentosus Willd. Malmedy. Lej. rugos.
Rubus glandulosus Bell. R. hybridus Lej. Malmedy. Lej. rugos.
Rubus montanus Libert. ined. Malmedy. Lej. rugos. c. Rosaceis. 23 Spec.
Rubus ardennensis Lib. ined. Malmedy. Lej. rugos.
Rubus fastigiatus L. Malmedy. Lej. rugos.

Rosa villosa L. Malmedy. Lej. Fl. Sp. Blumenau!
Rosa eminens Koch. In Hecken bei Offenbach. Juny. 1832. Wirtg.

Digitized by Google

Potentilla, verna.
— reptans.
Tormentilla, erecta,
Geum, urbanum.
— rivale.

Fingerkraut, Frühlings-F.
— gemeines.
Tormentille, aufrechte.
Benediktenkraut, gemeines.
— Sumpf-B.

Classis XIII.

Polyandria, stamina plura receptaculo inserta.

Ord. I. Monogynia, stilus unicus.

Chelidonium, majus. *
Papaver, rhœas. *
— dubium.
Tilia, europæa.
— microphylla.
Nymphæa, lutea.
— alba.

Ord. III. Trigynia, stili 3.

Delphinium. consolida.

Ordo V. Pentagynia, stili 5..

Aquilegia, vulgaris.

Ord. VI. Polygynia, stili plures.

Anemone, pratensis.
— nemorosa.
— ranunculoides.
— pulsatilla *

Klasse XIII.

Vielmännige, mehr als 20 Staubgefäße auf dem Fruchtboden.

Ordnung I. Einweibige, ein Pistill.

Schöllkraut, großes.
Mohn, wilder.
— Saat-M.
Linde, Sommer-L.
— Winter-L.
Seerose, gelbe.
— weiße.

Ord. III. Dreiweibige, 3 Pistille.

Ritterſporn, Feld-R.

Ordnung V. Fünfweibige, 5 Pistille.

Akelei, gemeine.

Ord. VI. Vielweibige, mehr als 5 Pistille.

Anemone, Wiesen-A.
— Busch-A.
— ranunkelartige.
— violette A., od. große Küchenſchelle.

Digitized by Google

Clematis, vitalba *	Waldrebe, gemeine.
Thalictrum, minus.	Wiesenraute, kleine.
Ranunculus, flammula.	Ranunkel, kleiner Sumpf-R.
— reptans.	— wurzelnder.
— lingua.	— großer.
— auricomus.	— goldgelber.
— sceleratus *	— sellerieblätteriger.
— aconitifolius.	— eisenhutblätteriger.
— bulbosus.	— knolliger.
— repens.	— kriechender.
— polyanthemos.	— vielblüthiger.
— acris. *	— scharfer.
— lanuginosus.	— wolliger.
— arvensis.	— Acker-R.
— hederaceus.	— epheublätteriger.
— heterophyllus.	— verschiedenblätteriger.
Ficaria, verna.	Scharbockskraut, Frühlings-Sch.
Caltha, palustris.	Dotterblume, Sumpf-D.

Classis XIV.

Didynamia, stamina 4, quorum 2 longiora.

Ord. I. Gymnospermia, semina nuda.

Ajuga, pyramidalis.	Günsel, pyramidenförmiger.
— reptans.	— kriechender.
Teucrium, scorodonia.	Gamander, wilder.
Verbena, officinalis.	Eisenhart, gemeiner.
Nepeta, cataria.	Katzenmünze, gemeine.
Mentha, silvestris.	Münze, Wald-M.
— rotundifolia.	— rundblätterige.

Klasse XIV.

Zweimächtige, 4 Staubgefäße, von welchen 2 länger.

Ord. I. Nacktsamige.

Digitized by Google

Trait dans la région d'Eifflen. Leg. Fl. Sp.

Ranunculus platanifolius Willd. Se trouve dans les bois aux environs de Malmedy, surtout à Rheinhein, et dans tous les environs d'Eupen. Leg. Fl. Sp.

Helleborus viridis L. Malmedy. Leg. Fl. Sp.

Polygonia. 31 Sp.

Ajuga pyramidalis L. Eupen. Leg. Fl. Sp.
Ajuga alpina L. Malmedy. Leg. Fl. Sp.

Digitized by Google

Mentha piperita L. Malmedy. Dom. Libert. Lej. Fl. Sp.
Mentha obtrata Pers. Malmedy. Lej. suppl.
Mentha rubra Pers. Malmedy. Lej. suppl.

Galeopsis grandiflora L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Galeopsis angustifolia Hoffm. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Betonica montana Lej. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Betonica hirsuta L. Eupen. Lej. Fl. Sp.

Marrubium vulgare L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Stellaria minor L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Cerastium parviflora. Poir. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Cerastium pinnatifidum Pers. Entre Goër & Eupen. Lej. Fl. Sp.
Cerastium grandiflora L. Entre Goër & Eupen Lej. Fl. Sp.

Digitized by Google

Mentha, aquatica.	Münze, Waſſer-M.
— arvensis.	— Acker-M.
— pulegium.	— Poley.
Glechoma, hederacea.	Gundelrebe, gemeine.
Lamium, album.	Taubeneſſel, weiße.
— purpureum.	— rothe.
— amplexicaule.	— umfaſſende.
— maculatum.	— gefleckte.
Galeobdolon, luteum.	Goldneſſel, gemeine.
Galeopsis, grandiflora.	Hohlzahn, großblüthiger.
— tetrahit.	— breitblätteriger.
— cannabina.	— hanfartiger.
Betonica, officinalis.	Betonie, gemeine.
Stachys, silvatica.	Zieſt, Wald-Z.
— palustris.	— Sumpf-Z.
— annua.	— jähriger.
— arvensis.	— Acker-Z.
Ballota, nigra.	Ballote, ſchwarze.
Marrubium, vulgare.	Andorn, gemeiner.
Leonurus, cardiaca.	Löwenſchweif.
Clinopodium, vulgare.	Weichborſte, gemeine.
Origanum, vulgare.	Doſten, gemeiner.
Thymus, serpyllum.	Thymian, wilder.
— lanuginosus.	— wolliger.
— acinos.	— Berg-Th.
Scutellaria, galericulata.	Helmkraut, gemeines.
Prunella, vulgaris.	Braunelle, gemeine.
— grandiflora.	— großblüthige.

Digitized by Google

Ord. II. Angiospermia, semina pericarpio inclusa.	Ord. II. Bedecktsamige, die Samen sind mit einer Samenhülle umgeben.
Orobanche, major.	Sommerwurz, große.
Euphrasia, officinalis.	Augentrost, gemeiner.
Rhinanthus, crista galli.	Hahnenkamm, gemeiner.
— villosus.	— zottiger.
Melampyrum, arvense.	Wachtelweizen, Acker-W.
— nemorosum.	— blauer.
— pratense.	— gelber.
— sylvaticum.	— Wald-W.
Pedicularis, palustris.	Läusekraut, Sumpf-L.
— sylvatica.	— Wald-L.
Antirrhinum, majus.	Löwenmaul, großes.
Linaria, arvensis.	Leinkraut, Acker-L.
— minor.	— kleines.
— vulgaris.	— gemeines.
Scrophularia, nodosa.	Braunwurz, gemeine.
— aquatica.	— Wasser-B.
Digitalis, purpurea. *	Fingerhut, purpurrother.
— floribus albis *	— weißblüthender.

Classis XV.

Tetradynamia, stamina 6, quorum 4 longiora.

Klasse XV.

Viermächtige, 6 Staubgefäße, von welchen 4 länger sind.

Ord. I. Siliculosa, pericarpia subrotunda.	Ord. I. Mit Schötchen, die nicht länger als breit sind.
Draba, verna.	Hungerblümchen, Frühlings-H.
Thlaspi, arvense.	Täschelkraut, Acker-T.
— alliaceum.	— Knoblauch-T.
— campestre.	— Feld-T.
— montanum.	— Berg-T.

Digitized by Google

Fugetaria numerosa Pers. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Pedicularis palustris L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Pedicularis sylvatica L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Rhinanthus glandulorum Lej. Malmedy. Lej. suppl.
Rhinanthus simplex Leir. Entre Limbourg & Eupen. Lej. Fl. Sp.
Digitalis purpurascens Roth. Malmedy. Lej. suppl.
Digitalis purpurea var. à fleur extérieure bifide. Celle Digital. media Roth. Malmedy Lej. sup
Digitalis intermedia Lej. Fl. Sp.
Digitalis ochroleuca Pers. Syn. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Lathraea Squamaria L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Didynamia 82 Sp.

Thlaspi praecox Gmel. Herb. Aix-la-Chapelle, Hilberg. Lej. Fl. Sp.

Digitized by Google

Erysimum praecox Rauschan !
entaria bulbifera L. Entre Niaux et Montjoie : Lej. Fl. Sp.
Cardamine nemorosa Lej. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Cardamine umbrosa Lej. Dans les bois ombragés près de Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Cardamine Impatiens L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Cardamine Calistilia Lej. Malmedy. Lej. suppl.
Sisymbrium palustre L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Sinapis villosa Murat ? Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Tetradynamia 26 Sp.

Digitized by Google

Thlaspi, bursa pastoris.
Alyssum, saxatile.
Iberis, nudicaulis.

Ord. II. Siliquosa, pericarpia longissima, polyspermum.

Erysimum, officinale.
— alliaria.
— cheiranthoides.
Cheiranthus, erysimoides.
— cheiri.
Arabis, thaliana.
Turritis, glabra.
— hirsuta.
Brassica, rapa.
— napus.
Cardamine, hirsuta.
— pratensis.
— amara.
Sisymbrium, nasturtium.
— strictissimum.
Sinapis, arvensis.
— alba.
— nigra.

Täschelkraut, Hirtentasche.
Steinkraut, eigentliches.
Zungenblume, nacktstengliche.

Ord. II. Mit Schoten, die viel länger als breit sind.

Hederich, Arznei-H.
— Knoblauch-H.
— levkojenartiger.
Levkoje, hederichartige.
— Goldlack.
Gänsekraut, gemeines.
Thurmkraut, kahles.
— rauhbehaartes.
Kohl, Rüben-K.
— Rübsen-K.
Schaumkraut, behaartes.
— Wiesen-Sch.
— bitteres.
Rauke, Quellen-R.
— steife.
Senf, Acker-S.
— weißer.
— schwarzer.

Classis XVI.

Monadelphia, stamina inferne in unum corpus coalita.

Ord. II. Pentandria, stamina 5.

Irodium, cicutarium.

Klasse XVI.

Einbrüderige, die Staubfäden sind in einen Körper verwachsen.

Ord. II. Fünfmännige, 5 Staubgefäße.

Reiherschnabel, schierlingsblätteriger.

Digitized by Google

Ord. IV. Decandria, stamina 10.

Geranium, sanguineum.
— pratense.
— molle.
— dissectum.
— rotundifolium.
— robertianum.

Ord. VI. Polyandria, stamina plurima.

Malva, rotundifolia.
— silvestris.

Ord. IV. Zehnmännige, 10 Staubgefäße.

Storchschnabel, blutrother.
— Wiesen-St.
— weicher.
— gespaltenblätteriger.
— rundblätteriger.
— stinkender.

Ord. VI. Vielmännige, mit sehr vielen Staubgefäßen.

Malve, rundblätterige.
— Wald-M.

Classis XVII.

Diadelphia, filamenta in duo corpora connexa.

Ord. I. Hexandria, stamina 6.

Fumaria, officinalis.
Corydalis, bulbosa.
— digitata.

Ord. II. Octandria, stamina 8.

Polygala, vulgaris.

Ord. III. Decandria, stamina 10.

Spartium, scoparium.
Genista, tinctoria.
— pilosa.
— anglica.
Ononis, spinosa.
Orobus, vernus.

Klasse XVII.

Zweibrüderige, die Staubfäden in 2 Körper verwachsen.

Ord. I. Sechsmännige, 6 Staubgefäße.

Erdrauch, gemeiner.
Lerchensporn, hohlwurzlicher.
— fingerförmiger.

Ord. II. Achtmännige, 8 Staubgefäße.

Kreuzblume, gemeine.

Ord. III. Zehnmännige, 10 Staubgefäße

Pfriemen, gemeine.
Ginster, Färbe-G.
— behaarte.
— englische.
Hauhechel, dornige.
Walderbse, Frühlings-W.

Digitized by Google

Geranium phaeum L. Leyen. Lej. Fl. Sp.
Geranium sylvaticum L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Monadelphia 9 Sp.

Polygala austriaca Crantz. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
var. à Liege rougeâtre; à fleurs jaunes, n'a encore été rencontrée qu'une seule fois près de Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Genista sagittalis L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Anthyllis Vulneraria L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Digitized by Google

Lathyrus tuberosus L. du côté de la Vigie supérieure. Cej. Fl. Sp.

Trifolium album Lois. (Melilotus) Malmedy. Cej. Fl. Sp.

Trifolium agrarium L. Malmedy. Cej. Fl. Sp.

Trifolium spadiceum L. Malmedy. Cej. Fl. Sp.

Trifolium procumbens L. var. 1. à tige dressée; var. 2. à tiges hérissées de longs poils roides et nombreux, Malmedy. Cej. suppl.

Medicago apiculata Willd. Se trouve sur les bords cultivés aux environs de Malmedy. Cej. Fl. Sp.

Diadelphia 29 Sp

Spiraea ulmaria L. Malmedy. Cej. Fl. Sp.

Polyadelphia 4 Sp.

Digitized by Google

Orobus, tuberosus.	Walderbse, knollige.
Lathyrus, pratensis.	Platterbse, Wiesen-P.
— silvestris.	— Wald-P.
Vicia, cracca.	Wicke, Vogel-W.
— villosa.	— einjährige.
— angustifolia.	— schmalblätterige.
— sepium.	— Zaun-W.
Ervum, tetraspermum.	Erve, viersamige.
— hirsutum.	— behaarte.
Ornithopus, perpusillus.	Vogelfuß, kleiner.
Melilotus, officinalis.	Steinklee, gemeiner.
Trifolium, repens.	Klee, kriechender.
— pratense.	— Wiesen-K.
— arvense.	— Acker-K.
— filiforme.	— fadenförmiger.
— medium.	— mittler.
Lotus, corniculatus.	Schotenklee, gehörnter.
— uliginosus.	— Sumpf-Sch.
Medicago, lupulina.	Schneckenklee, hopfenartiger.

Classis XVIII.

Polyadelphia, filamenta in tria, vel plura corpora connexa.

Ord. II. Polyandria, stamina plurima.

Hypericum, quadrangulare.	Johanniskraut, viereckiges.
— dubium.	— zweifelhaftes.
— perforatum.	— gemeines.
— humifusum.	— gestrecktes.

Klasse XVIII.

Vielbrüderige, die Staubfäden sind in 3 oder mehre Körper verwachsen.

Ord. II. Vielmännige, sehr viele Staubgef.

Digitized by Google

Classis XIX.

Syngenesia, antheræ in tubum connatæ.

Flores compositi.

Ord. 1. Polygamia æqualis.
Flosculi omnes hermaphroditi, fertiles.

Tragopodon, pratensis.
Sonchus, arvensis.
— oleraceus.
Lactuca, virosa *
Prenanthes, muralis.
Leontodon, taraxacum.
Hieracium, pilosella
— murorum.
— silvaticum.
— paludosum.
— villosum.
— sabaudum.
Crepis, tectorum.
— biennis.
Hypochoiris, radicata.
Lapsana, communis.
Cichorium, intybus.
Arctium, lappa.
— tomentosum.
Carduus, nutans.
Cnicus, acaulis.
Onopordon, acanthium.
Eupatorium, cannabinum.
Bidens, cernua.

Klasse XIX.

Verwachsenbeutelige, die Staubkolben sind in eine Röhre verwachsen.

Die Blumen bestehen aus Blüthchen.

Ord. 1. Gleichartige.
Alle Blümchen sind fruchtbare Zwitterblümchen.

Bocksbart, Wiesen-B.
Gänsedistel, Acker-G.
— Gemüse-G.
Salat, Gift-S.
Hasensalat, Mauer-H.
Löwenzahn, gemeiner.
Habichtskraut, gemeines.
— Mauer-H.
— Wald-H.
— Sumpf-H.
— zottiges.
— Savoyer-H.
Krepis, Dach-K.
— zweijährige.
Ferkelkraut, wurzelndes.
Rainkohl, gemeiner.
Cichorie, gemeine.
Klette, große.
— filzige.
Distel, überhängende.
Kratzdistel, stengellose.
Krebsdistel, gemeine.
Wasserdost, hanfartiger.
Zweizahn, überhängender.

Digitized by Google

Leontodon palustre Sm. Malmedy. Lej. Fl. Sp.

Hieracium dubium L. Malmedy. Lej. Fl.

Hieracium auricula L. Malmedy. Lej. Fl.

Hypochoeris minima L. Entre Rhénanrieux & Malmedy. Lej. Fl.

Hypochaeris maculata L. à Rhénanrieux, près de Malmedy. Lej. Fl.

Crepis biennis L. var. à rameaux floraux pubescens, au Crepis scabra Willd.
Malmedy. Lej. Reyn.

Picris hieracioides L. Malmedy. Lej. Reyn.

Cichorium Intybus L. Malmedy. Lej. Fl.

Tragopogon pratensis L. Malmedy. Lej. Fl.

Digitized by Google

Senecio cymosifolius L. Malmedy. Lij. Fl. Sp.

Arnica montana L. Hohe Veen.

Chrysanthemum corymbosum L. Eupen. Lij. Fl.

Chrysanthemum inodorum L. Malmedy. Lij. Fl.

Digitized by Google

Ord. II. Polygamia superflua.

Florcs disci hermaphroditi; radii feminei; omnes fertiles.

Tanacetum, vulgare.
Artemisia, vulgaris.
Gnaphalium, luteo-album.
— dioicum.
— rectum.
— uliginosum.
— pyramidatum.
— arvense.
— montanum.
Conyza, squarrosa.
Erigeron, canadense.
— acre.
Tussilago, farfara.
— petasites.
Senecio, vulgaris.
— viscosus.
— Jacobæa.
— sarracenicus.
Inula pulicaria.
— britannica.
Arnica, montana,
Bellis, perennis.
Chrysanthemum, leucanthemum.
— segetum.
Pyrethrum, parthenium.
Matricaria, chamomilla.
Anthemis, arvensis.
— cotula.

Ord. II. Ueberflüſſige.

Die Blümchen der Scheibe ſind Zwitter; die des Umkreiſes weiblich; alle ſind fruchtbar.

Rheinfarrn, gemeiner.
Beifuß, gemeiner.
Ruhrkraut, gelbweißes.
— Frühlings-R.
— gerades.
— Sumpf-R.
— pyramidenförmiges.
— Acker-R.
— Berg-R.
Dürrwurz, ſparrige.
Berufkraut, kanadiſches.
— gemeines.
Huflattig, gemeiner.
— großblätteriger.
Kreuzkraut, gemeines.
— klebriges.
— Jakobs-K.
— ſaraceniſches.
Alant, wellenblätteriger.
— Wieſen-A.
Wolverlei, Berg-W.
Maßlieb, ausdauerndes.
Wucherblume, weiße.
— eigentliche.
Bertramwurz, Mutterkraut-B.
Mutterkraut, gemeines.
Kamille, Acker-K.
— ſtinkende.

Digitized by Google

Achillea, ptarmica.
— millefolium.

Garbe, Sumpf-G.
— Schaf-G.

Ord. III. Polygamia frustranea.
Flosculi disci hermaphroditi; radii neutri, steriles.

Centaurea, cyanus.
— jacea.
— calcitrapa.

Ord. III. Fruchtlose.
Die Blümchen der Scheibe sind fruchtbare Zwitter, die des Umkreises unfruchtbare weibliche Blüthchen.

Flockenblume, Korn-F.
— gemeine.
— Stern-F.

Classis XX.

Gynandria, stamina pistillo, supra germen, inserta.

Ord. I. Monandria, stamina 1.

Orchis, bifolia.
— palustris.
— latifolia.
— maculata.
Ophrys, ovata.

Klasse XX.

Weibermännige, die Staubgefäße sind mit dem Pistill verwachsen.

Ord. I. Einmännige, ein Staubgefäß.

Orchis, zweiblätterige.
— Sumpf-O.
— breitblätterige.
— gefleckte.
Ophrys, eirundblätterige.

Classis XXI.

Monœcia, flores masculi et feminei in eadem planta.

Ord. II. Triandria, stamina 3.

Typha, latifolia.
— angustifolia.
Sparganium, ramosum.
— simplex.
Carex, vulpina.
— paniculata.
— cyperoides.

Klasse XXI.

Einhäusige, auf derselben Pflanze sind männliche und weibliche Blüthen.

Ord. II. Dreimännige, 3 Staubgefäße.

Rohrkolbe, breitblätterige.
— schmalblätterige.
Igelknospe, ästige.
— einfache.
Riedgras, Fuchs-R.
— rispenähriges.
— cypergrasartiges.

Digitized by Google

Achillea Ptarmica var. à feuilles très-étroites, glabres, linéaires, près de Malmedy. Lej. Fl.

Centaurea montana L. Malmedy. Lej. Fl.
Centaurea angustifolia Lej. Fl. Eupen. Lej. Fl.
Centaurea nigra L. Malmedy. var. à fleurs blanches aux environs de Malmedy

Syngenesia 57 sp.

Orchis conopsea L. Malmedy. Lej. Fl.

Satyrium viride L. Malmedy. Lej. Fl.
Satyrium albidum L. Malmedy Lej. Fl.
Ophrys palustris L., près de Malmedy, surtout du côté de Bévercé Lej. Fl.
Gynandria 5 sp. Ophrys Nidus-avis L. Malmedy. Lej. Fl.
Serapias longifolia L. Malmedy. Lej. Fl.
Serapias cordifolia L. Malmedy. Lej. Fl.

Carex dioica L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Carex leucoglochin L. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Carex Schreberi Willd. Malmedy. Lej. Fl. Sp.
Carex paradoxa Willd. Malmedy Lej. Fl. Sp.

Digitized by Google

Carex curta Good. Malmedy. Lej. Rl. Sp.
Carex bilgularis Bl. Cal. Hort. Bot. Monsp. Euphem. Malmedy. Lej. Rl. Sp.
Carex ampullacea Good. Malmedy. Lej. Rl.
Carex umbrosa Host. Malmedy. Lej.
Carex sorrentosa L. Malmedy. Lej.
Carex digitata L. Malmedy. Lej.
C. silicata Ung Stirp Austr. Maur. Moedjaic (Wien.)

Salsola pubescens Enoth. Malmedy. Lej. Rl.

Lauthinum Stramonium L. Malmedy. Lej. Rl.

Monoecia 38 Sp.

Digitized by Google

Carex, ovalis.	Riedgras, eirundähriges.
— canescens.	— graulichtes.
— stricta.	— steifblätteriges.
— pilulifera.	— Pillen-R.
— præcox.	— frühes.
— verna.	— Frühlings-R.
— glauca.	— graugrünes.
Ord. III. Tetrandria, stamina 4.	Ord. III. Viermännige, 4 Staubgefäße.
Alnus, glutinosa.	Erle, gemeine.
Urtica, urens.	Brennessel, kleine.
— dioica.	— große.
Ord. V. Polyandria, stamina plura quam 7.	Ord. V. Vielmännige, mehr als 7 Staubgef.
Arum, maculatum *	Aron, gemeiner.
Ceratophyllum, demersum.	Hörnerblatt, dornigsamiges.
— submersum.	— glattsamiges.
Sagittaria, sagittifolia.	Pfeilkraut, gemeines.
Poterium, sanguisorba.	Becherblume, gemeine.
Quercus, robur.	Eiche, Trauben-E.
— pedunculata.	— Stiel-E.
Fagus, silvatica.	Buche, gemeine.
Corylus, avellana.	Haselstrauch, gemeiner.
Betula, alba.	Birke, weiße.
Carpinus, betulus.	Hainbuche, gemeine.
Ord. VI. Monadelphia, filamenta inferne in unum corpus coalita.	Ord. VI. Einbrüderige, die Staubfäden in eine Röhre verwachsen.
Pinus, silvestris.	Kiefer, gemeine.
— strobus.	— Weymouths-K.
— larix.	— gemeiner Lerchenbaum.
— picea.	— Weißtanne.
— abies.	— Rothtanne.
Bryonia, alba *	Zaunrübe, weiße.
— dioica *	— rothbeerige.

Digitized by Google

Classis XXII.

Diœcia, flores masculi et feminei in diversis plantis.

Ord. I. Diandria, stamina 2.

Salix, pentandra.
— vitellina.
— fragilis.
— præcox.
— babylonica.
— rubra.
— uliginosa.
— aquatica.
— caprea.
— alba.

Ord. III. Tetrandria, stamina 4.

Viscum, album.

Ord. IV. Pentandria, stamina 5.

Cannabis, sativa.
Humulus, lupulus.

Ord. VI. Octandria, stamina 8.

Populus, alba.
— tremula.
— nigra.

Ord. VII. Enneandria, stamina 9.

Mercurialis, perennis.
— annua.

Ord. X. Monadelphia, filamenta inferne in unum corpus coalita.

Juniperus, communis.
Taxus, baccata *

Klasse XXII.

Zweihäusige, die männlichen und weiblichen Blüthen sind auf verschiedenen Pflanzen.

Ord. I. Zweimännige, 2 Staubgefäße.

Weide, Lorbeer-W.
— Gold- oder Dotter-W.
— Bruch-W.
— frühe.
— babylonische.
— rothe.
— Moraft-W.
— Wasser-W.
— Sohl-W.
— gemeine.

Ord. III. Viermännige, 4 Staubgef.

Mistel, weißer.

Ord. IV. Fünfmännige, 5 Staubgefäße.

Hanf, gemeiner.
Hopfen, gemeiner.

Ord. VI. Achtmännige, 8 Staubgefäße.

Pappel, Silber-P.
— Zitter-P.
— gemeine.

Ord. VII. Neunmännige, 9 Staubgefäße.

Bingelkraut, ausdauerndes.
— jähriges.

Ord. X. Einbrüderige, die Staubfäden sind in eine Röhre verwachsen.

Wachholder, gemeiner.
Eibe, gemeine.

Digitized by Google

Chara ceratophylla Bois. Malmedy. Bois.

Salix purpurea L. Malmedy. Cej. Fl. Sp.
Salix aurita L. Malmedy. Cej. Fl.
Salix acuminata L. Malmedy. Cej. Fl.
Salix ulmifolia Mill. Malmedy. Cej. Fl.
Salix marginata Cej, Malmedy. Cej. suppl.
S. arenaria L. Ruscinon. Mauri (Meig. & Wenger.)

Empetrum nigrum L. Se trouve sur les hautes Fagnes du côté de Bièvre
et, forêt de Malmedy. Cej. Fl.

Viscum 20 sp.

Digitized by Google

Veronica montana
Cyperus longus
Eriophorum caespitosum
Schoenus albus
Aira praecox
Lolium arvense
Gentiana Cruciata
— filiformis
Selinum palustre
Galanthus nivalis
Juncus squarrosus
— capitatus
— subverticillatus
Polygonum viviparum
Sedum palustre
Arenaria verna
Euphorbia Cyparissias
— segetalis
Anemone pratensis
Ranunculus Lingua
— aconitifolius
— hederaceus
— sanguinosus
Thymus sanguineus
Melampyrum nemorosum
— sylvaticum
Blasia allioides
— montana
Alyssum saxatile
Iberis nudicaulis
Cheiranthus erysimoides
Sisymbrium Sinapistrum
Genista anglica
Orobus vernus
Vicia villosa
— angustifolia
Trifolium pratense

Monandria	—	2 Sp.
Diandria	—	20 —
Triandria	—	45 —
Tetrandria	—	26 —
Pentandria	—	94 —
Hexandria	—	18 —
Heptandria	—	1
Octandria	—	20 —
Enneandria	—	1 —
Decandria	—	41 —
Dodecandria	—	11 —
Icosandria	—	23 —
Polyandria	—	31 —
Didynamia	—	52 —
Tetradynamia	—	26 —
Monadelphia	—	9 —
Diadelphia	—	29 —
Polyadelphia	—	4 —
Syngenesia	—	57 —
Gynandria	—	5 —
Monoecia	—	38 —
Dioecia	—	20 —
Summa		573 —

Hieracium villosum
Gnaphalium luteo-album
— pyramidale
Orchis palustris
Salix pratensis
— cinerea

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google